



鼎欣園地

112.12

認識肺炎黴漿菌

肺炎黴漿菌是目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效。



傳播方式

肺炎黴漿菌可經由人傳人傳播，藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。



潛伏期

約1至4週



症狀

最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。

約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘鳴（wheezing）、嘔吐或腹瀉等症狀。

併發症

WARNING
會重複傳染



少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病（史蒂芬強生症候群、多形性紅斑、毒性表皮溶解症）等嚴重併發症。

預防黴漿菌肺炎▶▶▶



沒有疫苗能預防黴漿菌



注意呼吸道衛生好習慣



經常洗手

預防方式

如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩；咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；平時落實用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。



洗手五步驟：

濕

搓

沖

捧

擦

內



1. 搓手心

外



2. 搓手背

夾



3. 搓指縫

弓



4. 搓指背

大



5. 搓大拇指和虎口

立



6. 搓指尖

腕



7. 搓手腕

個人衛生習慣主動做起 保護自己也守護他人



資料來源：



衛生福利部疾病管制署
Taiwan Centers for Disease Control

